

Holmes

Olmesartán medoxomilo



COMPRIMIDO RECUBIERTO

FORMAS FARMACEUTICAS Y PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

Embalaje contiene 10, 20, 30 o 60 comprimidos recubiertos de 20 mg o 40 mg de Olmesartán medoxomilo.

USO ORAL USO ADULTO

COMPOSICION:

Cada comprimido recubierto de 20 mg contiene:
Olmesartán medoxomilo.20mg
Excipientes* c.s.p. 1 comprimido
*lactosa, celulosa microcristalina, Hiprolosa, hipromelosa, estearato de magnesio, macrogol, alcohol polivinílico, dióxido de

silicio, copovidona, caolín, Laurilsulfato de sodio, dióxido de titanio.

Cada comprimido recubierto de 40 mg contiene:
Olmesartán medoxomilo.40mg
Excipientes* c.s.p. 1 comprimido
*lactosa, celulosa microcristalina, Hiprolosa, hipromelosa, estearato de magnesio, macrogol, alcohol polivinílico, dióxido de silicio, copovidona, caolín, Laurilsulfato de sodio, dióxido de titanio.

INFORMACIONES AL PACIENTE

1. ¿PARA QUE ES INDICADO ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento es indicado para el tratamiento de la presión arterial alta, o sea, la presión cuyas medidas están sobre 140 mm Hg (presión “alta” o sistólica) o 90 mm Hg (presión “baja” o diastólica).

2. ¿COMO FUNCIONA ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento actúa disminuyendo la presión arterial, que es la presión con que el

corazón hace circular la sangre por dentro de las arterias, pues provoca la dilatación de los vasos sanguíneos. El inicio de este efecto generalmente se manifiesta dentro de una semana después del inicio del tratamiento.

3. ¿CUÁNDO NO DEBO USAR ESTE MEDICAMENTO?

No debe usar este medicamento durante el embarazo, si es alérgico o sensible a cualquiera de los componentes de este producto. No debe usar este producto si es diabético y está utilizando aliskiren. Primer trimestre de gestación: Este medicamento no debe ser utilizado por mujeres embarazadas sin orientación médica.

Segundo y tercer trimestres de gestación: Este medicamento no debe ser utilizado por mujeres embarazadas sin orientación médica. Informe inmediatamente a su médico en caso de sospecha de embarazo

4. ¿QUE DEBO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Durante el uso del medicamento algunos cuidados deben ser tomados como los descritos a continuación:

- Pacientes con alteraciones de las funciones de los riñones y/o del hígado deben ser acompañados frecuentemente por un médico.
- Pacientes utilizando secuestradores de ácidos biliares: la dosis de Olmesartán medoxomilo debe ser tomada preferencialmente 4 horas antes de la dosis del secuestrador de ácidos biliares.
- Pacientes utilizando anti-inflamatorios no esteroideos: el uso de este medicamento junto con Olmesartán medoxomilo puede llevar a empeorar la función de los riñones. El efecto de Olmesartán medoxomilo puede ser reducido por el uso concomitante de anti-inflamatorios.
- Informe a su médico si usted usa otros medicamentos para reducir la presión, litio o aliskiren. Pacientes utilizando estos medicamentos pueden necesitar de monitoreos terapéuticos más próximos.

Lactancia: Informe a su médico si estuviera amamantando. El médico deberá decidir si descontinúa el amamantamiento o el uso de Olmesartán medoxomilo.

Uso geriátrico: En los estudios realizados con Olmesartán medoxomilo,

no fue observada ninguna diferencia entre pacientes anciano y los más jóvenes en cuanto a eficacia y seguridad. Uso en niños: No fueron establecidas la eficacia y seguridad en pacientes menores de 18 años.

Este medicamento puede ser tomado con o sin alimentos (la alimentación no influencia en la acción del medicamento). Informe a su médico si está haciendo uso de algún otro medicamento. No use medicamento sin el conocimiento de su médico. Puede ser peligroso para su salud. Usted puede sentir sueño o mareo durante el tratamiento de la hipertensión arterial. Si esto sucede, no conduzca ni utilice máquinas hasta que los síntomas hayan desaparecido. Consulte a su médico.

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

5. ¿DONDE, COMO Y POR CUANTO TIEMPO PUEDO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

Proteger de la luz y humedad. Número de lote y fechas de fabricación y validez: ver embalaje. No use este medicamento con el plazo de validez vencido. Guarde en su embalaje original. Los comprimidos recubiertos de Olmesartán medoxomilo 20 mg y 40 mg son blancos, circulares y biconvexos. Antes de usar, observe el aspecto del medicamento. En caso de que este en el plazo de validez y usted observe alguna diferencia en el aspecto, consulte al farmacéutico para saber si podrá utilizarlo. Todo medicamento debe ser mantenido fuera del alcance de los niños.

6. ¿COMO DEBO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Normalmente, la dosis inicial recomendada de Olmesartán medoxomilo es de 20 mg una vez al día. Para pacientes que necesitan de reducción adicional de la presión arterial, la dosis puede ser aumentada hasta 40 mg una vez al día. El comprimido debe ser ingerido entero, con agua, una vez al día.

Siga la orientación de su médico, respetando siempre los horarios, las dosis y la duración del tratamiento. No interrumpa el tratamiento sin el conocimiento de su médico. Este medicamento no debe ser partido, abierto o masticado.

7. ¿QUE DEBO HACER CUANDO SE ME OLVIDA USAR ESTE MEDICAMENTO?

En caso de que se olvide de tomar Olmesartán medoxomilo, podrá tomar el comprimido olvidado a lo largo del día. Si ya estuviera pronta la próxima toma deberá simplemente continuar la administración en el mismo horario de costumbre, sin tomar 2 comprimidos para compensar aquel que fue olvidado.

En caso de dudas consulte el farmacéutico o su médico.

8. ¿QUE REACCIONES ADVERSAS PUEDE CAUSAR ESTE MEDICAMENTO?

Así como cualquier medicamento, pueden aparecer algunos efectos indeseables durante

el uso de Olmesartán medoxomilo. Las reacciones observadas durante los estudios clínicos del medicamento como después del uso. Reacción común (ocurre entre 1% y 10% de los pacientes que utilizan este medicamento): tontura. Reacciones muy raras (ocurren en menos de 0,01% de los pacientes que utilizan este medicamento): dolor de cabeza, tos, dolor abdominal, náusea, vomito, rojo de la piel, prurito, hinchazón del rostro, hinchazón de las piernas, insuficiencia renal aguda, alteraciones en exámenes de laboratorio de sangre (por ejemplo: aumento de potasio, creatinina y enzimas del hígado), diarrea y shock anafiláctico.

Cuando usted presente diarrea fuerte y duradera que lleve a pérdida de peso consulte inmediatamente a su médico para reevaluar la continuación del tratamiento.

Informe a su médico, cirujano-dentista o farmacéutico el apareamiento de reacciones indeseables por el uso del medicamento.

9. ¿QUE HACER EN CASO DE SOBREDOSIS?

El uso de una cantidad mayor que la indicada podrá causar hipotensión (diminución de la presión arterial) provocando una sensación de debilidad y posiblemente mareo y oscurecimiento de la vista.

En este caso, la persona deberá permanecer en reposo, sentada o acostada, y procurar ayuda médica.

En caso de uso de grandes cantidades de este medicamento, procure rápidamente socorro médico y lleve el embalaje o folleto del medicamento.

10. INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS

En particular, informe a su médico sobre el uso de cualquiera de los siguientes medicamentos: Otros medicamentos reductores de la presión arterial, porque pueden incrementar el efecto de olmesartán. Puede que su médico deba modificar su dosis y/o tomar otras precauciones: Si está tomando un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o

aliskirén. Suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio, medicamentos que aumentan la eliminación de orina (diuréticos), o heparina (para fluidificar la sangre). El uso de estos medicamentos al mismo tiempo que HOLMES puede elevar los niveles de potasio en sangre. El litio (medicamento empleado para tratar los cambios del estado de ánimo y algunos tipos de depresión), ya que empleado a la misma vez que HOLMES puede incrementar su toxicidad. Si usted tiene que tomar litio, su médico medirá los niveles de litio en sangre. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (medicamentos para aliviar el dolor, hinchazón y otros síntomas de la inflamación, incluyendo artritis), ya que empleados a la misma vez que HOLMES pueden incrementar el riesgo de insuficiencia renal y disminuir el efecto de HOLMES. Colesevelam hidrocloreuro, un medicamento que disminuye el nivel de colesterol en sangre, ya que puede disminuir el efecto de HOLMES. Puede ser que su médico le aconseje tomar HOLMES al menos 4 horas antes de colesvelam hidrocloreuro. Ciertos antiácidos (remedios para la indigestión),

ya que pueden reducir ligeramente el efecto de HOLMES.

TODO MEDICAMENTO DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fabricado por:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castelo Branco, km 35,6
Itapevi - SP - Brasil

Registrado por:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castello Branco, 3.565
Itapevi - SP
CNPJ: 61.190.096/0001-92
Indústria Brasileira

Importado y Distribuido por: Eurofarma S.A. Quito- Ecuador

Venta bajo prescripción médica.